

## アロゲイン5 MXをご購入のお客様へ

本剤は、ミノキシジルを有効成分とする発毛剤です。正しくお使いいただくため、次のことをお守りください。

- ご購入の前に、裏面のチェックシートで壮年性脱毛症のセルフチェックを行ってください。
- 次の場合は本剤を使用しないでください。

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー一症状を起こしたことがある人。
- 女性。
- 20歳未満の人。
- 壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等）の人。
- 原因のわからない脱毛症の人。
- 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。
- 頭皮にきず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある場合。

- 次の人は本剤のご購入前に必ず医師又は薬剤師に相談してください。

- 高血圧・低血圧等で現在治療中の人。
- 狭心症等、心臓に障害のある人。
- 甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）の人。

- 商品をご購入する上でわからない点がありましたら必ず薬剤師に相談してください。

## アロゲイン5 MXを使用しているときのご注意

- 次のような場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

- 頭皮に発疹・発赤\*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等の症状があらわれた場合。  
\* 頭皮以外にあらわれることもあります。
- 頭痛が起きた場合。
- 胸の痛みがでたり、心拍が速くなったり、気が遠くなったり、めまいが起きた場合。
- 原因のわからない急激な体重増加がみられた場合。
- 手足がむくんだ場合。
- 脱毛状態の悪化や、頭頂部だけでなく側頭部や後頭部等の頭部全体の脱毛、頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛等がみられた場合。

- ご使用に際しては、製品に同封している説明文書や使用者向け情報提供資料をよくお読みになり、正しくお使いください。

## 壮年性脱毛症における発毛剤 ミノキシジル 5%

# アロゲイン5 MX

発売元

**佐藤製薬株式会社**

東京都港区元赤坂1丁目5番27号

製造販売元

**大興製薬株式会社**

埼玉県川越市下赤坂560番地1

第1類医薬品

 **sato**  
HEALTHCARE INNOVATION  
セルフメディケーションをサポートします

# ALOGAIN

ALOGAIN

# アロゲイン5 MX

## チェックシート

第1類医薬品

ご購入メモカード

# アロゲイン5 MX

# ALOGAIN

次回ご購入の際は、このカードを薬剤師へご呈示ください  
(ご本人のみ有効)。  
わからない点がありましたら、薬剤師に相談してください。

**sato**

アロゲイン5 MXのご購入は、薬剤師が承ります。  
セルフチェックを行い、このシートを薬剤師までお持ちください。

# チェックシート

本剤のご購入は、薬剤師が承ります。  
セルフチェックを行い、  
このシートを薬剤師までお持ちください。

## 効能

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。

## 用法・用量

成人男性（20歳以上）が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。  
★20歳未満は使用しないでください。

## 成分・分量（100mL中）

ミノキシジル 5.0g、パントテニールエチルエーテル 1.0g、ピリドキシン塩酸塩 0.05g、トコフェロール酢酸エステル 0.08g、l-メントール 0.3g  
添加物：エタノール、1,3-ブチレングリコール、pH調整剤

●ご使用に際しては、製品に同封している説明書や使用者向け情報提供資料をよくお読みになり、正しくお使いください。

お名前

## 【アロゲイン5 MXのご購入メモ（薬剤師記入表）】

1	年	月	日
ご購入店	薬剤師氏名		
2	年	月	日
ご購入店	薬剤師氏名		
3	年	月	日
ご購入店	薬剤師氏名		
4	年	月	日
ご購入店	薬剤師氏名		
5	年	月	日
ご購入店	薬剤師氏名		
6	年	月	日
ご購入店	薬剤師氏名		

●**薬剤師の方へ**  
お客様に説明を実施し、左記のご購入メモカードに記入後、ご購入されたお客様にお渡しください。

次の項目にあてはまる方は、にチェックを記入してください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある。  
Yes  ① 使用しないでください。  
No

女性である。  
Yes  ② 使用しないでください。本剤は男性用です。  
No

20歳未満である。  
Yes  ③ 使用しないでください。（国内での使用経験がありません。）  
No

頭髪が簡単に抜けてしまったり、脱毛の部分が円形や楕円形で、脱毛部分にうぶ毛がない。  
Yes  ④ 使用しないでください。（壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性あります。）  
No

急激に脱毛している。  
Yes  ⑤ きず、湿疹あるいは炎症（発赤）を治してから再確認してください。（きず等を悪化させることがあります。）  
No

頭皮にきず、湿疹あるいは炎症（発赤）がある。  
Yes  ⑥ 使用しないか、使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。（壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性あります。）  
No

以下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛ではない。  
Yes  ⑦ 使用を控えることをおすすめします。使用する場合は、必ず医師又は薬剤師に相談してください。（本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。）  
No

家族や兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人はいない。  
Yes  ⑧ 使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。（甲状腺疾患による脱毛の可能性あります。）  
No

高血圧・低血圧で現在治療を受けている。狭心症等、心臓に障害がある。  
Yes  ⑨ 使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。（副作用の発現率が高くなる可能性があります。）  
No

甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）の診断を受けている。  
Yes  ⑩ 一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなるため、使用前に、医師又は薬剤師に相談してください。（副作用の発現率が高くなる可能性があります。）  
No

薬や化粧品等によりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある。高血圧又は低血圧である。心臓や腎臓に障害がある。むくみがある。  
Yes  上記のいずれにも該当しない。又は該当した⑥～⑩について相談済みである。  
No

65歳以上である。  
Yes  アロゲイン5 MXを使用できます。使用上の注意や製品パッケージに記載された事項をよくお読みになり、ご購入ください。  
No